



Diabetes pode contribuir para infertilidade masculina

Universidade Estudo desenvolvido em Coimbra ajuda a esclarecer mecanismos de acção da diabetes no sistema reprodutor dos homens

Um estudo levado a efeito por investigadores do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da Universidade de Coimbra revela que a diabetes pode contribuir para a infertilidade masculina. Uma nota divulgada ontem pela Universidade de Coimbra refere que “os níveis elevados de açúcar [no sangue] não têm efeito directo nos espermatozoides, mas po-

derão comprometer a produção de esperma, contribuindo assim para a infertilidade masculina”, segundo conclui o estudo desenvolvido por uma equipa de investigadores do CNC.

O elevado nível de açúcar no sangue (a hiperglicemia) “desempenha um papel importante, mas não decisivo, na disfunção do espermatozoide ma-

duro”, sustenta Sandra Amaral, especialista que lidera o estudo.

“Neste sentido, temos conduzido mais investigação, que irá ser publicada brevemente, que sugere que a hiperglicemia influencia mais o processo da formação dos espermatozoides (a espermatogénese), do que os espermatozoides em si”, acrescenta a investigadora do grupo de Biologia da Repro-

dução e Células Estaminais do CNC.

Para Sandra Amaral, “este trabalho constitui um passo importante no esclarecimento dos mecanismos de acção da diabetes no sistema reprodutor masculino, permitindo delinear novas abordagens para estudos futuros”.

A pesquisa realizou-se num sistema ‘in vitro’, possibilitando

controlar e identificar todas as condições às quais os espermatozoides são expostos, refere a UC, sublinhando que este estudo é inovador, por “avaliar vários parâmetros de funcionalidade espermática, que não são usualmente avaliados”, mas que “fornecem informação muito mais detalhada sobre esta célula tão particular”.

Nas últimas décadas, tem-se assistido a “um notório aumento do número de casos da diabetes em todo o mundo, sendo que, actualmente, ultrapassa já um milhão de casos em Portugal”, que é “um número preocupante” para uma população com a dimensão da portuguesa.

A diabetes é uma das principais causas de morte nos países desenvolvidos e “tem efei-

tos prejudiciais em quase todos os sistemas de órgãos”, não sendo o sistema reprodutivo uma excepção. “Apesar de a diabetes ser uma doença multifatorial, existem várias indicações de que a hiperglicemia será o principal promotor das alterações promovidas pela doença”, afirma Sandra Amaral.

O estudo, que já foi publicado na revista ‘Reproduction’, foi desenvolvido, ao longo de vários anos, em colaboração com o serviço de Reprodução Humana do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. O grupo de investigadores envolvidos é constituído, além de Sandra Amaral, por Renata Tavares e por Joana Portela (primeiras autoras), por Paula Mota e por João Ramalho-Santos, que é presidente do CNC. ◀